

Topologia Geral
Lista 2/03 – Verão/2020

Atenção: Os exercícios que passei no quadro tem uma porção de erros... :-(
Se tiver algum erro no enunciado, o exercício
passa automaticamente a ser *encontrar o erro!* :-)

Exercício 1. Faça os exercícios 7.1.2, 7.2.7, 7.2.8 e 7.2.9 das notas de aula.

Exercício 2. Em $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, mostre que $[a, b] \cap \mathbb{Q}$ é *clopen* em \mathbb{Q} se, e somente se, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Exercício 3. Mostre que $B = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ **não** é aberto nem fechado em \mathbb{Q} .

Exercício 4. Seja $q_n \in \mathbb{Q}$ tal que $q_n \rightarrow \sqrt{2}$. Mostre que

$$B = \{q_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$$

é fechado mas não é aberto.

Exercício 5. Mostre que $B = \left\{ 3 + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ é aberto e não é fechado em

$$X = \left\{ m + \frac{1}{n} \mid m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Exercício 6. Seja $q_n \in \mathbb{Q}$ tal que $q_n \rightarrow \sqrt{2}$. Mostre que $B = \{q_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ é *clopen* em

$$X = \{m + q_n \mid m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*\}$$

Exercício 7. Sejam X um espaço topológico e $Y \subset X$ um subespaço de X . Ou seja, Y é munido da topologia induzida por X .

Dado $B \subset Y$, podemos considerar a *operação de fecho* em Y , $\text{cl}_Y(B)$, referente à topologia induzida em Y ; ou a operação de fecho em X , $\text{cl}_X(B)$. Mostre que

$$\text{cl}_Y(B) = \text{cl}_X(B) \cap Y.$$

Conclua que em particular, $B \subset Y$ é fechado em Y se, e somente se, $B = \text{cl}_X(B) \cap Y$.

Exercício 8. Se você não já o fez, use o exercício 7 e melhore a resolução dos exercícios 2 a 6 usando a operação de fecho para determinar se determinado conjunto é ou não fechado na topologia induzida.

Exercício 9. Suponha que (X, τ) seja um espaço topológico, e que \mathcal{F} seja uma família de funções

$$f : X \rightarrow (Y_f, \gamma_f)$$

de X em algum espaço topológico Y_f . Denote por τ_w a topologia inicial gerada pela família \mathcal{F} . Explique porque a condição $\tau_w \subset \tau$ equivale à continuidade de cada uma das $f \in \mathcal{F}$, quando consideramos a topologia τ em X .

Bônus: melhore a redação do enunciado desse exercício, que tá muito confuso! :-)

Exercício 10. Seja $(E, \|\cdot\|)$ um espaço vetorial normado de dimensão infinita. Considere a topologia fraca em E : τ_w . Ou seja, a *topologia inicial* gerada pelos funcionais lineares que são contínuos (na topologia da norma). Mostre que todo aberto fraco não vazio ($\emptyset \neq A \in \tau_w$) é um conjunto ilimitado.

Conclua que no caso de dimensão infinita, a topologia fraca é estritamente mais fraca (tem menos abertos) que a topologia da norma.

Exercício 11. Considere a *norma do máximo* $\|\cdot\|_\infty$ em \mathbb{R}^n (na verdade, o exercício funciona com qualquer norma em \mathbb{R}^n , pois todas são equivalentes). Mostre que a topologia fraca em $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ é igual à topologia inicial gerada pelas projeções

$$\begin{aligned} \pi_j : \quad \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto x_j \end{aligned}$$

E por sua vez, a topologia inicial gerada pelas projeções é igual à topologia da *norma do máximo*.
